


# Cultivo de arroz



BLANCO BIOLÓGICO	PREPARACIÓN DEL CAMPO	TRATAMIENTO A LA SEMILLA	PRE EMERGENCIA	POST EMERGENCIA TEMPRANA	POST EMERGENCIA MEDIANA	POST EMERGENCIA TARDÍA	MACOLLA-MIENTO	MÁXIMO EMBU-CHAMIENTO	INICIO FLORACIÓN	MÁXIMA FLORACIÓN	LLENADO DE GRANO	COSECHA
Malezas Gramíneas			MOISS 250 EC 4 l/ha			BOLD 180 EC 1,5 l/ha						
			PENDIMETALINA 400 EC PHYTOCARE 4 l/ha			DIAFOP 180 EC 1,5 l/ha						
			CLOMAZONE 480 EC PHYTOCARE 1,5 l/ha									
			MOISS 380 SC 1,8 l/ha									
Malezas Hoja ancha	GLIFOSATO 4 l/ha		BAIKAL 400 SC / CLICK 400 SC 0,125 l/ha									
			MOISS 380 SC 1,8 l/ha									
Malezas Cyperáceas	GLIFOSATO 4 l/ha			KIROV 60 WG 15 g/ha	2,4 D AMINA 480 0,4 l/ha							
				BERKUT 480 SL 2 l/ha								
Cucarro, Marranita, Chinchas de suelo		BARSUK FS 1 cc/k FIPRONIL 1 cc/k		FACTOR 200 SC 0,3 l/ha								
Spodoptera sp.				SIRTAK 240 SC 0,25 l/ha								
Sogata, Hydrellia, Chinchas				BOREY 200 SC 0,2 l/ha		TANREK 500 SC 0,1 l/ha		BOREY 200 SC 0,2 l/ha				
Pyricularia				KASUMEX 20 SL 1,5 l/ha								
Rhynchosporium oryzae						THRON 250 EC 0,5 l/ha						
Complejo fungoso en hoja								NOMAD 500 EC 0,4 l/ha				
								AZOBIN 250 SC 0,6 l/ha				
Complejo fungoso 1ª espiga							AZOBIN DUO 320 SC / ARKANO 325 SC 0,8 l/ha / 0,6 l/ha					
								AZOBIN 250 SC 0,6 l/ha				
								QUON 250 EC 0,5 l/ha				
Complejo fungoso 2ª espiga									AFOL 250 EC 0,4 l/ha			
									KYO 250 EC 0,5 l/ha			
									MANCOZEB 800 WP 4 k/ha			
									PROPINEB 700 WP 2 k/ha			