


Cultivo de papa



BLANCO BIOLÓGICO	PREPARACIÓN DEL CAMPO	SIEMBRA	PRE EMERGENCIA	EMERGENCIA	POST EMERGENCIA	DESARROLLO DE BROTES	TUBERIZACIÓN	INICIO DE FLORACIÓN	LLENADO DE TUBÉRCULOS	COSECHA	
Malezas Gramíneas			CLETHODIM & HALOXYFOP 0,8 l/ha								
Malezas Hoja ancha	GEOX 480 SL 2,5 l/ha		CHELNOK 700 WP 0,7 k/ha								
Pulgilla				IXOTIRN 50 EC 0,4 l/ha							
				BOREY 200 SC 0,1 l/ha							
Gusano blanco		BOREY 200 SC 0,4 l/ha									
		FACTOR 200 SC 0,6 l/ha									
Gota					ADALTO 720 SC 1,5 l/ha						
						FOSETYL - AL 80 WP 2 k/ha					
					HARD 70 WP 2 k/ha						
					VOSTOK 72 WP 2 k/ha						
Alternaria				CAPTAN 500 WP 500 g/caneca							
Rhizoctonia solani		FLUTRIAFOL & AZOXYSTROBIN 375 SC 0,4 l/ha									