



**DATOS GENERALES**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	464
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 L, 4 L, 20 L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	<p><b>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO</b></p>

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	<p>Ingrediente activo:            Captan .....480 g/L            Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro</p>
GENERALIDADES:	<p><b>CAPTAN® 480 SC PHYTOCARE</b>, fungicida protectante y curativo para el control de enfermedades en diferentes cultivos, con una alta actividad multisitio dentro de las células de los hongos.</p> <p><b>CAPTAN® 480 SC PHYTOCARE</b>, inhibe la respiración celular en el proceso de germinación de las esporas y crecimiento micelial.</p> <p><b>CAPTAN® 480 SC PHYTOCARE</b>, en mezcla con otros ingredientes activos es ideal para programas de manejo de resistencia.</p>

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
POMPÓN O CRISANTEMO	BOTRITIS ( <i>Botrytis cinérea</i> )	3.0 L/ha	***N.A.	12

\*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. \*\*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. \*\*\*N.A.: No aplica



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

**CAPTAN 480 SC PHYTOCARE** se debe aplicar a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad a intervalos entre 8 y 15 días de acuerdo con la incidencia y severidad de la enfermedad cuantificada en los monitoreos directos realizados.

#### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

**CAPTAN 480 SC PHYTOCARE** Se puede aplicar con los equipos convencionales como las bombas estacionarias, de espalda y/o propulsadas con tractor, debidamente calibradas. Usar boquillas de cono hueco y presión constante de acuerdo al equipo empleado.

Para preparar la mezcla, haga una pre-mezcla del producto con agua y agite. Luego adicione esta pre-mezcla al tanque de aplicación, el cual debe contener la mitad del volumen de agua a aplicar, agite, complete el volumen de la mezcla, agite y aplique a continuación.

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad. Para variedades nuevas se recomienda hacer pruebas de fitotoxicidad.

#### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 - 018000916012



CO-22/08/2019