



DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Polvo Mojable (WP)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	1205
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	500 g.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Mancozeb..... 640 g/kg Cymoxanil 80 g/kg Ingredientes aditivos..... c.s.p. 1 Kilo
GENERALIDADES:	<p>OVER 72 WP, es un fungicida sistémico y protectante con acción preventiva, curativa y erradicante. El componente Cymoxanil es rápidamente absorbido y translocado vía Xilema acropetalmente y el Mancozeb se distribuye sobre la superficie foliar ejerciendo su acción protectante.</p> <p>OVER 72 WP, controla eficientemente el grupo de los hongos oomicetos.</p>

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
TOMATE	GOTA O TIZÓN TARDÍO (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 kg/ha	7	4
PAPA	GOTA O TIZÓN TARDÍO (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 kg/ha	7	4

*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ***N.A.: No aplica

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

OVER 72 WP debe aplicarse con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, o condiciones ambientales de alta humedad que pueda predisponer la aparición de enfermedades. Según el desarrollo de la enfermedad y con condiciones ambientales favorables, repetir la aplicación a los cinco días después y rotar con fungicidas de mecanismo de acción diferente, para establecer un programa de manejo integrado de enfermedades.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

OVER 72 WP debe ser diluido en agua y aplicado garantizando un cubrimiento total de las estructuras de las plantas. Se puede aplicar por vía terrestre, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas de cono hueco y presión constante para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, efectuar una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea, indicada en el cuadro de usos autorizados, luego agréguela al tanque y continúe agitando, complete el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla, la cual se debe aplicar inmediatamente. Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen posteriormente.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 200-600 L/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 - 018000916012



CO-13/03/2020