



DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	1802
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 L, 4 L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Azoxystrobin 200 g/L Difenoconazole 125 g/L Ingredientes aditivos c.s.p. 1 Litro
GENERALIDADES:	<p>AZOCONOLE 325 SC es un fungicida con fuerte efecto preventivo, curativo y erradicante contra una amplia gama de enfermedades foliares de los cultivos. La composición de sus dos ingredientes activos presenta dos mecanismos y modos de acción diferentes, deteniendo los procesos respirativos debido a la inhibición de producción de energía a nivel del Citocromo 4, así como afectando la pared y membrana celular como consecuencia de la inhibición de la síntesis de ergosterol, componente fundamental de estas dos estructuras biológicas presentes en los hongos superiores.</p> <p>Azoxystrobin es un fuerte inhibidor de la germinación de esporas, impide el crecimiento micelial y muestra una notable actividad antiesporulante.</p> <p>Difenoconazole debido a su sistemicidad, penetra en los tejidos y se transporta acropetalmente ocasionando un fuerte efecto curativo.</p>

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR - "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ARROZ	<i>Rhizoctonia solani</i>	400 cc/ha	10	24

*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicarlo en forma preventiva o con los primeros síntomas de las enfermedades. De igual manera puede aplicarse con síntomas avanzados y alta presión de la enfermedad, logrando un efecto curativo sobre los patógenos susceptibles.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

AZOCONOLE 325 SC se puede aplicar por vía terrestre y en forma aérea, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor), los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados) para que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño. Seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado.

Para preparar la mezcla de aplicación, agite bien el envase antes de dosificar. Efectúe una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea indicada en el cuadro de usos autorizados, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregue la dosis recomendada del producto agitando continuamente y complete el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No presenta fitotoxicidad al cultivo, siguiendo las recomendaciones de uso y manejo recomendadas en la etiqueta del producto.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012



CO-05/06/2020