



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

**BOLD 180 EC**, es un herbicida post emergente sistémico para el control de malezas gramíneas, de rápida absorción a través del follaje de las plantas. La aplicación se debe hacer en post-emergencia temprana, con malezas gramíneas de 3 hojas a inicio de macollamiento. Rotar con otros herbicidas de diferentes mecanismos de acción, siguiendo las recomendaciones del HRAC

### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

**BOLD 180 EC** se puede aplicar por vía terrestre y aérea en forma dirigida, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas de cortina y presión baja para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas y causen daño a plantas no objetivo de control.

Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen posteriormente.

### Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 150-200 L/ha

Aplicación aérea: no menos de 40 L/ha

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

**BOLD 180 EC**, es compatible únicamente con los herbicidas pre-emergentes pendimetalina, triazopir y oxadiazon para el control post-emergente y residual de las malezas en el cultivo del arroz. **BOLD 180 EC** es incompatible con herbicidas para el control de hojas anchas y cyperaceas, tales como 2,4D amina, loxinil, triclopyr, bispiribac sodio, bentazon y sulfonilureas en general.

**BOLD 180 EC** en la dosis recomendada, es compatible con los cultivos registrados también es compatible con insecticidas organofosforados, piretroides, inhibidores de síntesis de quitina y carbamatos y con fungicidas utilizados en el cultivo de arroz.

### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 - 018000916012



CO-04/02/2020