




DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	266
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 L, 4 L, 20 L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Ametrina480 g/L Ingredientes aditivosc.s.p. 1 Litro
GENERALIDADES:	<p>CANE 500 SC es un herbicida a base de Ametrina para aplicación tanto pre-emergente como pos-emergente para el control de malezas en cultivos de caña de azúcar, piña, banano y palma de aceite, entre otros. Pertenece al grupo químico de las triazinas, su acción se basa en la inhibición de la fotosíntesis. Es absorbido por las malezas vía foliar y radicular. CANE 500 SC es eficaz para controlar las siguientes malezas: Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>), Liendre puerco (<i>Echinochloa colona</i>), Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Batatilla (<i>Ipomoea</i> spp), Atarraya (<i>Kallstroemia máxima</i>) y Escoba (<i>Sida acuta</i>).</p>

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	EPOCA DE APLICACIÓN	TEXTURA DEL SUELO	DOSIS	OBSERVACIONES	*P.C. (días)	**P.R. (horas)
CAÑA DE AZÚCAR	Pre-emergencia	Liviana - mediana - pesada	4.0 - 5.0 L/ha 5.0 - 6.0 L/ha	Eventualmente con surfactante no iónico al 0.3%	***N.A.	12
	Post-emergencia temprana	Todo tipo de suelo	4.0 - 5.0 L/ha		***N.A.	12



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	EPOCA DE APLICACIÓN	TEXTURA DEL SUELO	DOSIS	OBSERVACIONES	*P.C. (días)	**P.R. (horas)
PIÑA	Pre-emergencia (pos-transplante)	Liviana - mediana - pesada	3.0 - 4.0 L/ha 5.0 - 6.0 L/ha	Eventualmente con surfactante no iónico al 0.3%	14	12
	Post-emergencia temprana	Todo tipo de suelo	3.0 - 5.0 L/ha		14	12
BANANO	Post-emergencia dirigida	Mediana Pesada	3.0 - 6.4 L/ha	Con adición de surfactante no iónico al 0.3%, 2-3 tratamiento/año.	***N.A.	12
PALMA AFRICANA	Post-emergencia dirigida	Mediana Pesada	3.0 - 6.4 L/ha	Con adición de surfactante al 0.3% en plantaciones mayores de un año.	***N.A.	12

*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ***N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

CANE 500 SC, se recomienda aplicar una vez por ciclo de cultivo; en pre-emergencia en suelos bien preparados y húmedos, en post-emergencia aplicarlo sobre malezas en activo crecimiento con malezas gramíneas a inicio de macollamiento y las hojas anchas con altura de 10-15 cm.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

CANE 500 SC se puede aplicar con equipos convencionales terrestres, con boquillas de cortina y con volúmenes de mezcla de 200-400 L/ha. Para preparar la mezcla, agregue al tanque, al menos la mitad del agua a usar, adicione la dosis del surfactante no iónico, agite, agregue la cantidad de **CANE 500 SC** recomendado, agite, haga el triple lavado de los envases y agréguelo al tanque, complete el volumen de la mezcla, agite y aplique a continuación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad, del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones de las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad. Para variedades nuevas se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 - 018000916012



CO-04/02/2020