



DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Polvo Mojable (WP)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	1826
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	150 g, 1 kg.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Metribuzin.....700 g/kg Ingredientes aditivosc.s.p. 1 kilo
GENERALIDADES:	<p>CHELNOK[®] WP es un herbicida selectivo sistémico, residual, con acción de contacto a base de Metribuzin, usado para el control pre emergente de malezas gramíneas y hojas anchas en el cultivo de papa.</p> <p>CHELNOK[®] WP es absorbido por las malezas principalmente por las raíces, sin embargo, también puede ser absorbido en contacto por las hojas, con posterior translocación acropetal a través del xilema. Actúa bloqueando la fotosíntesis, específicamente, inhibiendo la transferencia de electrones en el fotosistema II.</p>

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

CHELNOK[®] WP debe ser aplicado dentro de un programa de rotación de herbicidas de diferentes mecanismos de acción, recomendado por el Comité de Prevención de Resistencia a Herbicidas – HRAC y completado con prácticas de manejo integrado del cultivo. **CHELNOK[®] WP** debe ser aplicado en dosis altas en suelos de gran contenido de arcilla y humus. En suelos muy livianos con bajo contenido de arcilla y humus (menos de 1%) no es recomendado su aplicación. En suelos con un contenido de humus de más de 6%, se recomienda usar la mayor dosis y el suelo con buena humedad.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

CHELNOK[®] WP debe ser diluido en agua y aplicado garantizando un cubrimiento total de las estructuras de las malezas. Se debe aplicar por vía terrestre, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

acopladas a tractor), los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpio y calibrado), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño y evitando que la deriva de la aplicación llegue a otros cultivos. Seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado y utilizar boquillas de cortina y presión constante. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada de **CHELNOK[®] WP** agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente. Limpie bien todo el equipo usado inmediatamente después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se apliquen posteriormente.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: no menor de 200 L/ha

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
PAPA	GUASCA (<i>Galinsoga ciliata</i>), CALZÓN/BOLSA DE PASTOR (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), ORTIGA (<i>Urtica urens</i>), VERÓNICA-GOLONDRINA (<i>Veronica persica</i>), BOTÓN DE ORO (<i>Senecio vulgaris</i>), LECHOSA-CERRAJA (<i>Sonchus oleraceus</i>), PASTO PERRO – TRIGUILLO (<i>Bromus sp.</i>), KIKUYO (<i>Pennisetum clandestinum</i>), CIZAÑA-PATEGALLINA-ALTAMISA (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), CENIZO (<i>Chenopodium sp.</i>), GUALOLA (<i>Poligonum segetum</i>), TRÉBOL DE HUERTO AGRIO (<i>Oxalis latifolia</i>)	0.6 – 0.7 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación de CHELNOK [®] WP, en pre-emergencia, sobre suelo húmedo.	***N.A.	4
SOYA	TRIPA DE POLLO (<i>Euphorbia hirta</i>), HIERBA SOCIALISTA (<i>Emilia sonchifolia</i>), BOTÓN NEGRO (<i>Hyptis capitata</i>), BOTONCILLO (<i>Eclipta alba</i>), MELONCILLO (<i>Cucumis melo</i>), PALO DE AGUA (<i>Ludwigia linifolia</i>), ESPADILLA (<i>Corchorus orinocensis</i>), TOMILLO (<i>Mollugo verticilata</i>)	0.43 kg/ha Se recomienda hacer una (1) aplicación de CHELNOK [®] WP, en pre-emergencia, sobre suelo húmedo y semilla tapada.	***N.A.	4

*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ***N.A.: No aplica en función del momento de aplicación.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012



CO-13/03/2020