



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de **CIPROX 100 SL**, por aspersión foliar a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, de acuerdo al cuadro de usos, condiciones ambientales y con base a los resultados del monitoreo y el grado de infestación, aplicándose dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, y complementando con demás prácticas de manejo integrado de cultivo y recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas (FRAC).

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

CYPROX 100 SL, puede ser aplicado con equipos convencionales de espalda, tractor o aérea debidamente calibrados, con un volumen de mezcla dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, se debe emplear agua limpia y volúmenes que garantice un buen cubrimiento de la planta con adecuado tamaño de gota.

Para preparar la mezcla, agregue agua al tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad, adicione la cantidad de **CIPROX 100 SL** dosificado, agite, agregue el resto de agua agite y aplique.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad. Para variedades nuevas se recomienda hacer pruebas de fitotoxicidad.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 - 018000916012



CO-13/03/2020