



### DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	2308
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 L, 4 L, 200 L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 <b>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO</b> 

### INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Quinclorac.....250 g/L Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro
GENERALIDADES:	<p><b>OKUN<sup>®</sup> 250 SC</b>, herbicida selectivo al cultivo de arroz, para el control de gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. Se recomienda su uso en post-temprana solo o en mezcla con Propanil.</p> <p><b>OKUN<sup>®</sup> 250 SC</b>, actúa como regulador de crecimiento, similar al ácido Indolacético, estimulando síntesis de auxinas y causando la muerte por sobre-crecimiento y agotamiento de reservas de las plantas.</p>

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	MALEZA			DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ARROZ	<u>GRAMINEAS</u> Liendrepuerco <i>(Echinochloa colona)</i>	<u>HOJA ANCHA</u> Palo de agua <i>(Ludwigia linifolia)</i> Sesbania <i>(Sesbania exaltata)</i>	<u>CIPERÁCEAS</u> Cortadera <i>(Cyperus esculentus)</i>	1.5 L/ Ha	***N.A.	0

\*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. \*\*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. \*\*\*N.A.: No aplica.



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda 01 (una) aplicación de **OKUN<sup>®</sup> 250 SC** en post emergencia de las malezas en activo crecimiento y buenas condiciones de humedad cuando las malezas tengan de 1 a 3 hojas, dentro de un programa de rotación de herbicidas de diferentes mecanismos de acción, recomendado por el Comité de Prevención de Resistencia a Herbicidas – HRAC.

#### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

**OKUN<sup>®</sup> 250 SC** se puede aplicar por vía terrestre y en forma dirigida, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas tipo cortina y presión constante para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas y causen daño al cultivo o plantas no objetivo de control. Para preparar la mezcla de aplicación, efectuar una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea, indicada en el cuadro de usos autorizados, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen después.

#### Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 150-200 L/ha

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

#### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012



CO-13/03/2020