



DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Concentrado Emulsionable (EC)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	765
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 L, 20 L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Pendimetalina400 g/L Ingredientes aditivosc.s.p. 1 Litro
GENERALIDADES:	<p>PENDIMETALINA 400 EC PHYTOCARE es un herbicida selectivo al cultivo de arroz sistémico, pre y post-emergente residual de amplio espectro de acción, en especial contra malezas gramíneas y algunas especies de hoja ancha.</p> <p>PENDIMETALINA 400 EC PHYTOCARE, se debe aplicar sobre la semilla de arroz tapada.</p>

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ARROZ	LIENDRE DE PUERCO (<i>Echinochloa colonum</i>) PAJA PELUDA (<i>Paspalum pilosum</i>) GUARDA ROCÍO (<i>Digitaria sanguinalis</i>) CAMINADORA (<i>Rottboelia exaltata</i>) PATA DE GALLINA (<i>Eleusine indica</i>) FALSA CAMINADORA (<i>Ischaemun rugosum</i>) VERDOLAGA (<i>Portulaca oleracea</i>) PAJA MONA (<i>Leptochloa filiformis</i>)	4.1 L/ Ha	***N.A.	24

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar dentro de un programa de rotación de herbicidas de diferentes mecanismos de acción, recomendado por el Comité de Prevención de Resistencia a Herbicidas – HRAC y completado con prácticas de manejo integrado del cultivo.

Aplicar **PENDIMETALINA 400 EC PHYTOCARE**, en suelo húmedo y bien preparado, o sea, sin terrones, para facilitar la absorción por los coloides del suelo y la exposición de las semillas de las malezas. Se aplica de 1-8 días después del primer moje de germinación, en arroz con semillas tapadas. Si el arroz se germina aplicar hasta con 10 días después germinado.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

PENDIMETALINA 400 EC PHYTOCARE se puede aplicar por vía terrestre en forma dirigida, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas cortina y presión constante para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas y causen daño al cultivo o plantas no objetivo de control. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen posteriormente.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 120- 150 L/ha

Aplicaciones aéreas: 14-16 gls/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012



CO-13/03/2020