PYRIPROXYFEN 100 EC

VASCAL

Ficha Técnica

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 Nº 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	INSECTICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Concentrado Emulsionable (EC)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	1753
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 L, 4 L, 20 L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO** **CUIDADO**

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Pyriproxyfen .....100 g/L Ingredientes aditivos .....c.s.p. 1 Litro
GENERALIDADES:	**PYRIPROXYFEN 100 EC,** es un insecticida perteneciente al grupo de los reguladores de crecimiento IGR, que tiene movimiento translaminar con acción por ingestión y contacto. Es un mímico de la hormona juvenil que inhibe la embriogénesis de huevos, el desarrollo larvario y la metamorfosis de inmaduros, al igual que la fertilidad y la oviposición de estos últimos. También perturba la diapausia en insectos tales como Mosca Blanca, Trips y minadores. **PYRIPROXYFEN 100 EC,** tiene efectos mínimos sobre artrópodos benéficos y no objetivos de control.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ALGODÓN	Mosca blanca *(Bemisia tabaci)*	500 cc/ha	***N.A.	24
TOMATE	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporarium)*	500 cc/ha	***N.A.	24
UCHUVA				

Juntos crecemos bien

avgust
crop protection

PYRIPROXYFEN 100 EC

VASCAL

Ficha Técnica

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
LULO	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporarium)*	500 cc/ha	***N.A.	24
TOMATE DE ÁRBOL				
AJÍ				
PIMENTÓN				
BERENJENA				

***P.C.: Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. ****P.R.: Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. *****N.A.:** No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Algodón: Realizar la aplicación antes de la apertura de las cápsulas o tan pronto se observen los primeros adultos. Umbral de daño económico: 30% del área foliar ocupada por ninfas de primer instar.

Tomate: Aplicar con la aparición de la plaga. Previo monitoreo y de acuerdo al umbral de daño económico de 1 a 5 individuos, estimado sobre 50 hojas en 20 mt2. Volumen de agua 600 litros/Ha. Máximo una aplicación.

Cultivos menores: Se Iniciarán las aplicaciones tan pronto como se observan las primeras ninfas o estados inmaduros en el envés de las hojas, o según sea necesario para evitar el daño económico. Aplicación terrestre. Se aplicará garantizando un cubrimiento completo. Se evitará aplicar cuando las condiciones del viento ponen en peligro una cobertura completa. No se aplicará el follaje a pleno sol y con rocío en la mañana temprana. La aplicación se realiza en forma dirigida a la base de las plantas y al envés de las hojas cuando aparezcan las primeras ninfas. Se realizará una buena cobertura de la aplicación, asegurando el contacto con el producto Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. Máximo una aplicación.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agregue la dosis total del producto a la mitad del volumen de agua recomendado, agite y agregue el resto del volumen de agua.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

PYRIPROXYFEN 100 EC es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.

Compatible con la mayoría de productos utilizados en el control fitosanitario, en caso de duda realizar pruebas previas. No fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso y manejo de la etiqueta del producto.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012

CO-01/06/2020

Juntos crecemos bien

avgust crop protection