



### DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Polvo Mojable (WP)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	537
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	120 g.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	<b>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO</b> 

### INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Dimethomorph .....500 g/kg Ingredientes aditivos .....c.s.p. 1 Kilo
GENERALIDADES:	<b>VERSUS 50 WP</b> , fungicida preventivo, curativo, erradicante con acción sistémica traslaminar, para el control de hongos Oomycetos responsables de la enfermedad llamada Mildeo Velloso en diferentes cultivos. Su acción antiesporulante inhibe la elongación del esporangioforo y formación del esporangio con reducción de nueva infección.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ROSA	MILDEO VELLOSO ( <i>Peronospora sparsa</i> )	750 g/ha o 0.6 g/L con volumen de mezcla de 1200 L/ha	***N.A.	4
PAPA	GOTA O TIZÓN TARDÍO ( <i>Phytophthora infestans</i> )	0.36 kg/ha	7	4

\*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. \*\*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. \*\*\* N.A.: No aplica



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de **VERSUS 50 WP** de acuerdo al cuadro de usos, condiciones ambientales y con base a los resultados del monitoreo y el grado de infección de la enfermedad, incluyéndose dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, y complementando con demás prácticas de manejo integrado de cultivo y recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas (FRAC).

**VERSUS 50 WP** se recomienda aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad o condiciones ambientales favorables para su desarrollo; hacer dos aplicaciones con intervalo de 5 días y rotar con otro fungicida de mecanismo de acción diferente.

#### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

**VERSUS 50 WP** se puede aplicar por vía terrestre, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, auto-propulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas de cono hueco y presión constante. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregue la cantidad de producto, de acuerdo con la tabla de uso, debidamente pre-diluido, complete el volumen con más agua, agite y aplique inmediatamente

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen posteriormente.

#### Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 1200 L/ha

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad. Para variedades nuevas se recomienda hacer pruebas de fitotoxicidad.

#### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012



CO-13/03/2020