



DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	2767
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	250 mL, 1 L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Penoxsulam.....240 g/L Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro
GENERALIDADES:	RICEMASTER 240 SC herbicida de uso pre-y post-emergente en el cultivo de arroz, con acción sistémica y selectivo al cultivo. Se recomienda para el control de <i>Echinochloa colona</i> y algunas malezas ciperáceas, hojas anchas y gramíneas. Pertenece al grupo químico de las Triazolopyrimidinas sulfonamidas con acción inhibitoria sobre la ALS.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ARROZ	LIENDRE PUERCO (<i>Echinochloa colona</i>) GUARDA ROCIO (<i>Digitaria horizontalis</i>) CORTADERA (<i>Cyperus iria</i>) FALSA CAMINADORA (<i>Ischaemun rugosum</i>)	170 cm ³ /ha Aplicar una sola vez por ciclo de cultivo en pre emergencia	60	0

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

RICEMASTER 240 SC se debe aplicar una sola vez por ciclo de cultivo y se puede hacer sobre la semilla de arroz destapada o tapada e incluso en proceso de germinación. Se recomienda aplicar sobre suelos húmedos, pero, sin charcos.

RICEMASTER 240 SC puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. En aplicaciones aéreas se debe conservar la franja de seguridad a los cultivos susceptibles como soya, algodón, girasol, maní, ajonjolí, algunos frutales y hortalizas.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agite varias veces el producto en su envase original antes de mezclarlo con agua. Agregue la cantidad requerida directamente al tanque de aspersión, el cual debe contener agua $2/3$ de su capacidad, efectuar la mezcla manteniendo agitación constante. Agregue el resto del agua y proceda a la aplicación. Asperjar con viento en calma para evitar arrastre. En aplicaciones terrestres se recomienda utilizar volúmenes entre 100 y 200 litros de agua por hectárea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

RICEMASTER 240 SC, se puede mezclar con herbicidas pre-emergentes, post-emergente, insecticidas y fungicidas de uso frecuente en arroz. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad. Para variedades nuevas se recomienda hacer pruebas de fitotoxicidad.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012



CO-19/03/2021