

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspension Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	1017
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	500 cc, 1 L, 4 L.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Bispyribac-sodium400 g/L Ingredientes aditivosc.s.p. 1 Litro
GENERALIDADES:	<p>BAIKAL[®] SC, es un herbicida de amplio espectro post emergente sistémico para el manejo de malezas gramíneas, commelináceas y de hoja ancha. La exclusiva formulación de BAIKAL[®] SC lo hace un producto de mejor desempeño en campo con mayor acción de control, selectivo al cultivo de arroz que debe ser aplicado en los primeros estados de desarrollo de las malezas. BAIKAL[®] SC, es un herbicida sistémico, absorbido rápidamente por vía foliar y radicular, llegando a los puntos de crecimiento donde ejerce su acción herbicida. Los síntomas iniciales se observan después del cuarto día de aplicado y la muerte de plantas, una semana después.</p>

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ARROZ	GUARDA ROCIO (<i>Digitaria sanguinalis</i>) PIÑITA (<i>Murdannia nudiflora</i>) PALO DE AGUA (<i>Ludwigia linifolia</i>) LEPTOCLOA (<i>Leptocloa spp</i>) BOTON BLANCO (<i>Eclipta alba</i>)	0.125 ml/ha + 1ml/L Surfactante no iónico (Realizar una aplicación cuando el arroz tenga de 3 a 4 hojas y las malezas 2 hojas)	***N.A.	0

*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ***N.A.: No aplica.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de **BAIKAL[®]SC** de acuerdo a la tabla de usos, sobre las malezas en pleno estado de crecimiento, cuando el suelo este húmedo, en un día con la seguridad de aproximadamente ocho horas sin lluvia después de la aspersión. Utilizar el producto dentro de un programa de rotación de herbicidas de diferentes mecanismos de acción, recomendado por el Comité de Prevención de Resistencia a Herbicidas – HRAC y completado con prácticas de manejo integrado del cultivo. El número de aplicaciones depende del grado de infestación del cultivo, se deben hacer evaluaciones de las aplicaciones del producto cada 2 días después de realizada la aplicación.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla de aplicación llene hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad a aplicar de surfactante o aceite no iónico y de **BAIKAL[®]SC** según la dosis recomendada y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplicación un cubrimiento uniforme de las plantas. Los equipos usados en la aplicación deben ser lavados cuidadosamente después de cada aplicación, por lo menos tres veces.

Debe aplicarse por vía terrestre utilizando bombas de espalda o estacionarias y volumen de mezcla de 200 a 300 Litros/ha de acuerdo al desarrollo de las arvenses. También se puede aplicar vía aérea; siguiendo los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el ingeniero agrónomo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

BAIKAL[®] SC no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes no recomendados o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad. **BAIKAL[®] SC** no es fitotóxico para los cultivos indicados y en las dosis recomendadas.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012



CO-04/02/2020