



**DATOS GENERALES**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: | AVGUST COLOMBIA S.A.S.<br>Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia<br>Tel: (57) 310 451 3336   |
| CLASE:                       | FUNGICIDA AGRÍCOLA   |
| FORMULACIÓN:                 | Suspensión Concentrada (SC)  |
| REGISTRO NACIONAL ICA N°:    | 1446   |
| PRESENTACIONES AUTORIZADAS:  | 250 cc, 1 L.   |
| INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:    | <br><b>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO</b><br> |

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| COMPOSICIÓN GARANTIZADA: | Ingrediente activo:<br>Azoxystrobin.....250 g/L<br>Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro  |
| GENERALIDADES:           | <b>MONACO<sup>®</sup> SC</b> es un fungicida de amplio espectro perteneciente al grupo químico de las Estrobilurinas con acción preventiva, curativa y erradicante. Inhibe la germinación de esporas y el desarrollo micelial y también muestra actividad antiesporulante. |

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
 “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO                                 | ENFERMEDAD  | DOSIS   | *P.C./días | **P.R./horas |
|---|---|---|------------|--------------|
| ARROZ                                   | COMPLEJO MANCHADO DE GRANO<br>( <i>Helminthosporium oryzae</i> ,<br><i>Cercospora oryzae</i> , y<br><i>Sarocladium oryzae</i> ) | 0.6 L/ha<br>Realizar la aplicación foliar a los 75-80 días después de la germinación o a los primeros síntomas. | 14         | 4            |
| AGUACATE<br>( <i>Persea americana</i> ) | ANTRACNOSIS<br>( <i>Colletotrichum</i> spp)   | 0.6 L/ha  | 3          | 4            |

\*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. \*\*P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de **MONACO**<sup>®</sup> **SC** con base a los resultados del monitoreo y el umbral de acción, las condiciones ambientales, aplicándose dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, y complementando con demás prácticas de manejo integrado de cultivo y recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas (FRAC).

### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

**MONACO**<sup>®</sup> **SC** se puede aplicar por vía terrestre y en forma dirigida, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas de cono hueco y presión constante para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas y causen daño al cultivo o plantas no objetivo de control. Para preparar la mezcla de aplicación, agite bien el envase antes de dosificar, efectuar una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea, indicada en el cuadro de usos autorizados, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen después.

### Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 150-200 L/ha

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad y fitotoxicidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012



CO-10/08/2021