

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	FERTILIZANTE CON BASE EN ZINC CON AMINOÁCIDOS PARA APLICACIÓN FOLIAR
FORMULACIÓN:	Concentrado Soluble (SL)
REGISTRO DE VENTA ICA N°:	13141
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1L, 4L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	<p>Zinc total (Zn).....19.9 g/L Aminoácidos libres*61.9 g/L * Contiene los siguientes aminoácidos libres: ALANINA, ASPARTATO, GLICINA, GLUTAMATO Y PROLINA. pH en solución 10%4.86 Densidad a 20°1.2524 g/ml</p> <p><i>Salmonella sp</i>.....Ausente en 25 g Enterobacterias totales.....<10 UFC/ g Metales pesados por debajo de los límites establecidos</p>
GENERALIDADES:	<p>RIZOFORTE®, es un producto diseñado para inducir y estimular el crecimiento de las raíces y mayor macollamiento.</p> <p>RIZOFORTE®, está formulado a base de aminoácidos libres, enriquecido con Zinc, de rápida absorción y asimilación, para aplicación en épocas tempranas del desarrollo.</p> <p><i>Para la venta y aplicación de este fertilizante es recomendable la prescripción de un Ingeniero Agrónomo con base en análisis de suelos o de tejido foliar"</i></p>

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
ARROZ	1.5 L/ha	2 aplicaciones 15 y 25 días después de germinado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda hacer dos aplicaciones, con una frecuencia de 10 días. En épocas de establecimiento o cuando la planta este en momento para renovación de raíces.

Las dos aplicaciones del producto **RIZOFORTE®** en el cultivo de arroz se recomiendan al inicio de macollamiento (10-15 d.d.g.) y 10 días después; se puede mezclar con Propanil. Rizoforte en arroz incrementa la longitud de raíz, el peso seco de raíz, el número de macolla por planta, el número de hojas por planta y el peso seco de la parte aérea de la planta.

PREPARACION DE LA MEZCLA Y FORMA DE APLICACIÓN:

En el tanque de aspersión o tanque auxiliar deposite agua limpia por lo menos hasta la mitad. Luego agregue la cantidad recomendada del producto agitando la mezcla mientras efectúa la operación, después complete con agua hasta completar el volumen final. Aplique la mezcla tan pronto como sea posible evitando su almacenamiento prolongado. Use equipo adecuado y correctamente calibrado para obtener cubrimiento uniforme de las plantas.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: Arroz: 200 L/ha

COMPATIBILIDAD:

RIZOFORTE® es compatible con la mayor parte de los agroquímicos de uso común. Ante cualquier duda recomendamos hacer pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico cuando se usa siguiendo las indicaciones dadas en esta etiqueta.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

No contaminar fuentes o corrientes de agua con la disposición de residuos de lavado del equipo u otros desperdicios del producto, especialmente donde haya peces o se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para el ganado. Enjuagar a fondo, añadiendo el enjuague al tanque de mezcla. Inutilice el envase de acuerdo a las indicaciones de las autoridades locales de salud.

En caso de derrame del producto puede recogerse fácilmente usando agua o empleando aserrín o algún otro material absorbente. Después de recogido el producto lave el lugar con abundante agua

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 – 018000916012

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.



V02-CO-19/04/2023