



DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N°108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	INSECTICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Gránulos Solubles (SG)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	PL0002982022
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	150 g.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	<p style="text-align: center;">CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO</p>

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Dinotefuran..... 200 g/kg Ingredientes aditivos c.s.p. 1 Kilo
GENERALIDADES:	CENTROLE 20® SG se basa en la unión a receptores nicotínicos postsinápticos de acetilcolina que paraliza la conducción de impulsos en el sistema nervioso de los insectos. Es un insecticida neonicotinoide de tercera generación de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión. Detiene la alimentación de la plaga rápidamente. Este es un nuevo insecticida que pertenece a la subclase FURANICOTINYL. Grupo químico: Neonicotinoide.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ROSA	Thrips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0 g/L de agua	***N.A.	4
ARROZ	Chinche (<i>Oebalus poecilus</i>)	150 g/ha	7	4

*P.C.: Período de Carenicia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ***N.A: No aplica



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar CENTROLE 20® SG solo o en mezcla con otros insecticidas de diferente grupo químico, para implementar planes de rotación adecuados y lograr un mayor espectro de control insecticida enmarcado dentro de un manejo integrado de plagas para evitar riesgos resistencia. Aplicar con la aparición de los primeros instares ninfales.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregue la dosis total del producto a la mitad del volumen de agua a aplicar, agite y agregue el resto del volumen de agua.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

En rosa: Se recomienda aplicar con volumen de agua de 1.000 litros de agua/ hectárea requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox.

Aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre, en buen estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de hacer la mezcla definitiva. Este producto no es fitotóxico al cultivo cuando se aplica siguiendo las indicaciones presentadas en esta etiqueta.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Altamente tóxico para abejas"
- "Puede matar abejas y polinizadores"
- "No aplicar en presencia de abejas o en época de floración del cultivo"
- "No aplicar en horas de alta actividad de abejas"
- "Respetar las franjas de seguridad con relación a fuentes de agua"
- "No contaminar fuentes o cursos de agua"

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



V03-CO-21/06/2024