



CLICK[®] 40 SC

Ficha Técnica

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	HERBICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	PL0002222023
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 L.
INDICACIONES DE PELIGRO:	Nocivo en caso de ingestión / Nocivo en contacto con la piel/ Nocivo si se inhala / Tóxico para organismos acuáticos
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO PELIGRO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Bispyribac sodium.....400 g/L Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro
GENERALIDADES:	CLICK[®] 40 SC , es un herbicida sistémico y post-emergente que controla malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en arroz de riego y secano. Bispyribac-sodium actúa inhibiendo la acción de la enzima Aceto Lactato Sintetasa (ALS), esencial en la producción de aminoácidos Valina, Leucina e Isoleucina, causando la detención del crecimiento, clorosis y muerte de las malezas. Siempre debe aplicarse con un coadyuvante no iónico, para mejorar y acelerar la penetración del producto dentro de la planta. Las malezas afectadas detienen su crecimiento, se tornan moradas, para luego secarse y morir. El efecto del producto se observa claramente luego de 8 a 12 días después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Juntos crecemos bien

avgust
crop protection



CLICK® 40 SC

Ficha Técnica

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	*L.M.R.	**P.C./días	***P.R./horas
ARROZ	COQUITO (<i>Cyperus esculentus</i>) PIÑITA (<i>Murdannia nudiflora</i>) BOTONCILLO (<i>Eclipsa alba</i>) GUARDA ROCÍO (<i>Digitaria sanguinalis</i>) BARBA DE INDIO (<i>Fimbristylis annua</i>)	0.125 L/ Ha (Post temprana, aplíquese con malezas de 1-2 hojas) + 1 ml/L Surfactante no iónico	0.02 mg/kg	***N.A.	0

*L.M.R.: Límite máximo de Residuos: Arroz: Fuente: USDA. *P.C.: Período de Carenia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ***N.A: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

CLICK® 40 SC se recomienda aplicar una vez por ciclo de cultivo en post-emergencia temprana, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Herbicidas, HRAC.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

CLICK® 40 SC debe ser diluido en agua y aplicado garantizando un cubrimiento total de las estructuras de las malezas. Se puede aplicar por vía terrestre en forma dirigida, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas de cortina y presión constante para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas y causen daño al cultivo o plantas no objetivo de control. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del coadyuvante no iónico agitando continuamente, luego adicione la dosis recomendada del producto y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen después.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Respetar la franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre con relación a los cuerpos de agua."
- "Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar."

Juntos crecemos bien

avgust 
crop protection



CLICK[®] 40 SC

Ficha Técnica

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- "En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin."
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos."
- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre"

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



V06-CO-18/07/2024

Juntos crecemos bien

avgust 
crop protection