



DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: (57) 310 451 3336
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Polvo Mojable (WP)
REGISTRO NACIONAL ICA N°:	PL0019992023
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	40 g, 400 g, 25 kg.
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Myclobutanol.....400 g/kg Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Kilo
GENERALIDADES:	SERPICO® 40 WP es un fungicida sistémico de la familia de los triazoles con actividad preventiva y curativa. Actúa impidiendo la biosíntesis de los ergosterolos de los hongos o sustancias presentes en las membranas de las células en donde regulan los intercambios entre el medio ambiente y el interior.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
ARROZ	MANCHADO DEL GRANO (<i>Alternaria graminícola</i> , <i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Cercospora oryzae</i> , <i>Curvularia lunata</i> , <i>Pyricularia grisea</i> , <i>Sarocladium oryzae</i> , <i>Rhynchosporium oryzae</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	0.075 kg/ha (75 g/ha) (Aplique en primera o segunda espiga)	7	4



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
PASSIFLORAS	MARACUYÁ			
	GULUPA			
	GRANADILLA	CLADOSPORIUM (<i>Cladosporium cladosporioides</i>)		
	BADEA	BOTRYTIS (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.12 kg/ha (120 g/ha)	7
	CHULUPA	ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>)		
	CURUBA			
CEBOLLA				
CEBOLLA LARGA				
CEBOLLÍN	MANCHA PURPURA (<i>Alternaria porri</i>)	0.04 kg/ha (40 g/ha)	7	4
CEBOLLÍN CHINO				
PUERRO				
TOMATE				
UCHUVA				
LULO	ALTERNARIA (<i>Alternaria sp</i>)	0.12 kg/ha (60 g/200L)	3	4
TOMATE DE ÁRBOL				
AJÍ				

Juntos crecemos bien

avgust
crop protection



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
PIMENTÓN	ALTERNARIA (<i>Alternaria sp</i>)	0.12 kg/ha (60 g/200L)	3	4
BERENJENA				
AJÍ DULCE				
FRESA				
ARÁNDANO ALTO				
ARÁNDANO OJO DE CONEJO				
ARÁNDANO CRAMBERRY	ANTRACNOSIS (<i>Glomerella cingulata</i>)	0.04 kg/ha (40 g/ha)	3	4
FRAMBUESA				
MORA				
BREVO				
UVA				
FRIJOL	ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	0.06 kg/ha (60 g/ha)	1	4
ARVEJA CHINA				
ARVEJA DULCE				
GUANDUL				
HABICHUELA				



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
HABICHUELIN	ANTRACNOSIS (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	0.06 kg/ha (60 g/ha)	1	4
HABA				
CAUPI				
KUDZU				
ORNAMENTALES	ROYA BLANCA DEL CRISANTEMO (<i>Puccinia horiana</i> Henn)	0.24 kg/ha (240 g/ha)	***N.A.	4

P.C.: Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. *P.R.: Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado, las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido *** **N.A.:** No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de SERPICO® 40 WP de acuerdo a la tabla de usos, condiciones ambientales y con base a los resultados del monitoreo y el umbral de acción, aplicándose dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, y complementando con demás prácticas de manejo integrado de cultivo y recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas (FRAC).

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

SERPICO® 40 WP debe ser diluido en agua y aplicado garantizando un cubrimiento total de las estructuras de las plantas. Se puede aplicar por vía terrestre en forma dirigida, utilizando los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas de cono hueco y presión constante para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas y causen daño al cultivo o plantas no objetivo de control. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen después.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: Arroz 100-120 L/ha; Pasifloras 200-400 L/ha; Cebolla 200-400 L/ha; Tomate 400 L/ha, Fresa 200 L/ha; Frijol 200 L/ha. Ornamentales 1200 L/ha



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Respetar la franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre con relación a los cuerpos de agua."
- "Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar."
- "En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin."
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos."
- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre."

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



V04-CO-21/06/2024